

CAMPO FABIÁN GROSSO, GENERAL CABRERA, CÓRDOBA

Más vainas con el programa de nutrición foliar

Evaluación / fuente: INTA EEA General Cabrera · Ricardo Pedelini


+ 687 kg/ha

ACOGRA 1 frente al testigo sin tratamiento

TRATAMIENTO Y COMPARACIÓN

ACOGRA 1: CORAZÓN HUECO precomercial 5 + 5 L/ha, en primera y segunda floración/clavado, seguido de CALCIO 5 L/ha al comienzo del llenado.

RESULTADOS INFORMADOS



Lectura técnica. ACOGRA 1 y ACOGRA 3 superaron significativamente al testigo en rendimiento. ACOGRA 1 alcanzó +19,4% frente al testigo, calculado con las medias publicadas. Los esquemas de menor dosis o aplicación única no mostraron superioridad significativa.

Cómo se evaluó. Cultivar EC 394. Cuatro repeticiones; parcelas de cuatro surcos de 10 m. Aplicaciones: 11/01, 30/01 y 16/02/2024. Diferencia mínima significativa: 457 kg/ha.

Alcance de los resultados. No se observó fitotoxicidad. El porcentaje de confitería fue 70,3% en ACOGRA 1 y 61,7% en el testigo; la tabla de calidad no aporta una prueba de significancia para esa diferencia. Evaluación de una campaña.