

SABACHO, LA JULIANA Y SAN FERNANDO, ENTRE RÍOS

Nutrición temprana dentro de un manejo sanitario

Evaluación / fuente: CREA Litoral Sur


+363 kg/ha

Respuesta media del esquema GRASS + fungicida

TRATAMIENTO Y COMPARACIÓN

POWERPLANT GRASS 6 L/ha en Z3.2 y fungicida LIS 1 en Z3.9. Se compara con el testigo sin aplicaciones y con el fungicida solo.

RESULTADOS INFORMADOS



Lectura técnica. La respuesta media del esquema combinado fue +363 kg/ha frente al testigo; el fungicida solo aportó +316 kg/ha. La diferencia descriptiva entre ambos esquemas fue de 47 kg/ha. El incremento total no debe atribuirse a GRASS por sí solo.

Cómo se evaluó. Microparcels en tres localidades, con nutrición de base y manejo de malezas. Predominó mancha amarilla; en San Fernando también se observó roya amarilla.

Alcance de los resultados. Respuesta del esquema ACOGRA por sitio: -172 kg/ha en Sabacho, +770 en La Juliana y +491 en San Fernando. No se informa una significancia específica del contraste GRASS + fungicida frente a fungicida solo. Medias del gráfico calculadas a partir del testigo y las respuestas publicadas.